Anwendbarkeit zu benützen und eine Probe des Wassers zu diesem Zwecke zu untersuchen.

Wie schon vorläufig, wurde diese Probe in der Flasche, kurz direkt in eine reine Flasche einlaufen gelassen, sie erwies sich als vollständig klar, geruchlos und frei von auffälligem Geschmacke.

In 1 Ltr Wasser wurden nachgewiesen:

153,0 mg gelöste Stoffe, davon
17,8 " Kochsalz,
0 " Ammoniak,
0 " salpetrige Säure,
22,1 " Salpetersäure.

Zur Oxydation der organischen Stoffe wurden 0,5 mg Sauerstoff verbraucht.

Zu diesen Resultaten ist zu bemerken, dass sie zwar nicht ausreichen, ein abschließendes Urtheil über den Werth des betreffenden Wassers als Trinkwasser zu ermöglichen, zu einem solchen würde auch eine bakteriologische Untersuchung erforderlich sein, zu deren Ausführung jedoch die Vorbereitungen am 31 ersten Monats nicht getroffen sein waren.

Immerhin gestattet das Ergebniß der chemischen Untersuchung sich dahin auszusprechen, dass Anhaltspunkte zu einer Beanstandung des Wassers bezüglich seiner Brauchbarkeit als Trinkwasser nicht aufgefunden werden und